

Новости медицинской науки

Апрель 2018

По наблюдениям Бонна, радий обнаруживает замечательное действие на живые, особенно растущие элементы: стоит в течение нескольких часов продержать под лучами радия головастика или другой зародыш, чтобы убедиться, что в росте их наступает ряд расстройств, которые держатся несколько дней спустя после опыта. Особенно сильно повреждается ядерная часть клеточек.

Врач. 1903. № 20.

The British Medical Journal указывает на вред твердых зубных щеток, которые больше стирают эмаль и, сверх того, отдельные щетинки которых могут вести к опасным явлениям, попадая в гортан и вчервеобразный придаток.

Врач. 1903. № 20.

В какие часы суток чаще всего умирают люди? Для разрешения этого вопроса один врач отмечал случай за случаем часы смерти 2880 лиц всех возрастов, в населении очень смешанном, за несколько лет. Наибольшее число умерших пришлось на 6-й час утра, а наименьшее на часы между 9 и 11 утра; для первого смертность оказалась на 40 % выше средней, а для вторых на 6,5 % ниже. Еще в 1864 г. Гавиланд сообщил о часе 5 6000 смертей и показал, что смерть наступает всего чаще между 1 и 8 часами утра, а всего реже между 1 часом пополудни и полночью, то есть больные умирают чаще в те часы, когда за ними не ухаживают и не кормят их. Затем в 1888 г. доктор Ч. Фере собрал данные относительно часа наступления смерти в Сальпетриер и Бисетр за 10 лет; вышло, что смерть наблюдается

менее часто в часы от 7 до 11 вечера. Финлейсон и Ватсон в Глазго вывели из 15000 случаев, что больше всего умирает людей между 4 и 10 часами утра, особенно между 5 и 6. По Шнейдеру в Берлине (57000 случаев) особенно опасны часы от 4 до 7 утра, а по Берсенсу в Филадельфии от 6 до 7.

Врач. 1903. № 22.