

# Новости медицинской науки Октябрь 2018

Профессор Бейли (Йельский университет) подверг обработке статистику самоубийств в Соединенных Штатах с 1897 по 1901 г. всего 1000 случаев. Из этого числа 7781 случай падает на мужской пол и 2219 на женский, что дает отношение 3,5 к 1. Наибольшее число самоубийств приходится на возраст между 30 и 40 годами, затем следует период 20-30 лет, а на время между 20 и 50 годами падает почти 2/3 всех случаев самоубийств. Достоинно еще внимания, что женатые кончают жизнь самоубийством чаще, чем одинокие. Наиболее частый способ самоубийства - стрельба, за которым следует отравление. Из побудительных причин на первый план выступают отчаяние и деловые потери, затем дурное здоровье, помешательство, разочарование в любви и выпивка (под влиянием последней мужчины убивают себя в 17 раз чаще, чем женщины, а от деловых потерь - в 13). Излюбленный день для самоубийств - понедельник, затем воскресенье, а по субботам их совершается всего меньше; мужчины предпочитают понедельник, а женщины субботу. Интересны, наконец, в статистике автора данные относительно времени дня, когда наиболее совершаются самоубийства: оказывается, что 3687 случаев произошли в течение 12 часов до полудня, а 5848 - в остальные 12; начиная от полуночи число самоубийств непрерывно нарастает до 6 часов пополудни, затем падает в промежутке между 6 и 9 часами вечера, а от 9 до полуночи достигает своего максимума.

Врач. 1903. № 45.

Доктор Вортиш сообщает о чрезвычайно редком случае родов негритянкой 6 младенцев - 5 мальчиков и 1 девочки. Новорожденные все умерли через несколько дней после родов. У их матери это были пятые роды. По ее

словам, первые 4 раза она рожала то двойни, то тройни.

Врач. 1903. № 46.